

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Loratadine Teva 10 mg comprimés

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Chaque comprimé contient 10 mg de loratadine.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Excipient (à effet notoire) :

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

haque comprimé contient 62,5 mg de lactose monohydraté.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

3. FORME PHARMACEUTIQUE

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Comprimé.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Comprimés blancs ovales comportant une face avec une barre de cassure et une face lisse, avec les inscriptions "L" et "10" de chaque côté de la barre de cassure.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La barre de cassure n'est là que pour faciliter la prise du comprimé, elle ne le divise pas en doses égales.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

4. DONNEES CLINIQUES

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

4.1 Indications thérapeutiques

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Les comprimés Loratadine Teva sont indiqués pour le traitement symptomatique de la rhinite allergique et de l'urticaire chronique idiopathique

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

4.2 Posologie et mode d'administration

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Posologie

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Adultes

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Un comprimé à 10 mg une fois par jour.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Population pédiatrique

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

L'efficacité et de Loratadine Teva n'ont pas été établies. donnée disponible.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Patients atteints d'insuffisance hépatique

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Chez les patients atteints d'insuffisance hépatique sévère, la dose initiale devra être diminuée en raison d'un risque de clairance réduite de la loratadine. Une dose initiale de 10 mg tous les deux jours est recommandée pour l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Patients souffrant d'insuffisance rénale :

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Il n'est pas nécessaire de modifier la posologie.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

âgés :

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

n'est nécessaire .

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Mode d'administration

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Voie orale. Le comprimé peut être pris indifféremment par rapport aux repas.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

4.3 Contre-indications

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La loratadine doit être administrée avec précaution dans le traitement des patients souffrant d'insuffisance hépatique sévère (voir rubrique 4.2).

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Etant donné que les antihistaminiques peuvent masquer ou réduire des réactions cutanées positives, le traitement par *Loratadine Teva* doit être arrêté pendant au moins 48 heures avant de réaliser des tests de sensibilité cutanés.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Une interaction potentielle peut se produire avec tous les inhibiteurs connus du CYP3A4 ou CYP2D6 entraînant des taux élevés de loratadine (voir rubrique 5.2), ce qui peut provoquer une augmentation des effets indésirables.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

On a fait état, dans des études cliniques contrôlées, de taux augmentés de loratadine après administration simultanée de kétoconazole, d'érythromycine ou de cimétidine, mais sans modifications cliniquement significatives (y compris de l'électrocardiogramme).

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Population pédiatrique

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Les études d'interaction ont été menées chez l'adulte uniquement.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Grossesse.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Une grande quantité de données sur les femmes enceintes (plus de 1000 d'expositions expectées) indiquent aucune toxicité malformatif ni fœto / néonatale de la loratadine. Les études effectuées chez l'animal n'ont pas mis en évidence une toxicité directe ou indirecte sur la reproduction (voir rubrique 5.3). Par mesure de précaution, la prise de Loratadine Teva doit être évitée pendant la grossesse.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Allaitement.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La loratadine est excrétée dans le lait maternel. Loratadine Teva femme qui allaite.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Fertilité.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Il n'y a pas de données disponibles concernant la fertilité masculine ou féminine.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Loratadine Teva n'a aucun effet délétère sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Cependant, les patients doivent être informés que très rarement certaines personnes ont décrit une somnolence qui pourrait affecter leur capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

4.8 Effets indésirables

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Résumé du profil de sécurité.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Lors des études cliniques menées chez les adultes et adolescents dans les indications rhinite allergique et urticaire chronique idiopathique, à la dose recommandée de 10 mg, les effets indésirables avec la loratadine ont été rapportés chez 2% de patients de plus que ceux traités par placebo. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec une plus grande fréquence que sous placebo étaient: somnolence (1,2%), céphalées (0,6 %), augmentation de l'appétit (0,5%) et insomnie (0,1%).

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Liste des effets indésirables

Les effets indésirables rapportés depuis la commercialisation sont divisés en groupe selon les fréquences définies dans la Convention MedDRA : La terminologie et les fréquences suivantes sont appliquées : très fréquent ($\geq 1/10$), fréquent ($\geq 1/100$ à $< 1/10$), peu fréquent ($\geq 1/1000$ à $< 1/100$), rare ($\geq 1/10\ 000$ à $< 1/1000$) et très rare ($< 1/10\ 000$), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont listés en ordre de gravité diminuante.

Système	Fréquence	Effet indésirable
Affections du système immunitaire	très rare	réactions d'hypersensibilité (y compris œdème de Quincke et anaphylaxie)
Affections du système nerveux	très rare	Vertiges, convulsions
Affections cardiaques	très rare	Tachycardie, palpitation
Affections gastro-intestinales	très rare	nausées, bouche sèche, gastrite
Affections hépatobiliaires	très rare	Anomalie des fonctions hépatiques
Affections de la peau et du tissu sous-cutané	très rare	Éruption cutanée, alopecie
Troubles généraux et anomalies au site d'administration	très rare	Fatigue
Investigations	fréquence indéterminée	prise de poids

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Population pédiatrique

Lors des études cliniques menées dans la population pédiatrique, chez des enfants âgés de 2 à 12 ans, les effets indésirables fréquents rapportés avec une plus grande fréquence que sous placebo étaient : céphalées (2,7%), nervosité (2,3%) et fatigue (1%).

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Déclaration des effets indésirables suspectés

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance - .

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

4.9 Surdosage

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Le surdosage en loratadine augmente la survenue de symptômes anticholinergiques. Somnolence, tachycardie et céphalées ont été rapportées lors de surdosages.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

En cas de surdosage, un traitement symptomatique et un maintien des fonctions vitales sont préconisés et maintenus aussi longtemps que nécessaire. Du charbon activé en suspension dans l'eau peut éventuellement être administré. Un lavage gastrique peut être envisagé. La loratadine n'est pas éliminée par hémodialyse et on ne sait pas si la dialyse péritonéale permet de l'éliminer. Le patient doit rester sous surveillance médicale après le traitement d'urgence.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Classe pharmacothérapeutique: Antihistaminiques □ Antagoniste H₁.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Code ATC: R06A X13.

Mécanisme d'action.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La loratadine, le principe actif de Loratadine Teva, est un antihistaminique tricyclique doté d'une activité sélective sur les récepteurs H₁ périphériques.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Effets pharmacodynamiques.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Chez la plupart des patients, la loratadine n'a pas de propriétés sédatives ni anticholinergiques cliniquement significatives lorsqu'elle est utilisée aux doses recommandées.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Lors du traitement prolongée, il n'y a pas eu de modifications cliniquement significatives des paramètres vitaux, des résultats des tests biologiques, des examens cliniques ni d'électrocardiogrammes.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La loratadine n'a pas d'effet significatif sur les récepteurs H₂. Elle n'inhibe pas la capture de la noradrénaline et n'a pratiquement aucun effet sur la fonction cardiovasculaire ni sur l'activité du pacemaker cardiaque intrinsèque.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Des études sur la réaction papuleuse induite à l'histamine sur la peau humaine, suite à l'administration d'une dose de 10 mg a montré que l'effet antihistaminique est visible dans les 1 à 3 heures, atteignant un pic à 8-12 heures et persistant au-delà de 24 heures. Il n'y a pas de preuve de tolérance à cet effet après 28 jours de traitement à la loratadine.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Efficacité et sécurité clinique

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Plus de 10.000 sujets (de 12 ans et plus) ont été traités avec les comprimés de loratadine 10 mg, dans des essais cliniques contrôlés. L'effet sur l'amélioration des symptômes nasaux et non-nasaux des rhinites allergiques avec un comprimé de loratadine 10 mg administré une fois par jour était supérieur au placebo et similaire à la clémastine. Dans ces études, la somnolence était moins fréquente avec la loratadine qu'avec la clémastine et aussi fréquente avec la terfénaire et le placebo.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Parmi ces sujets (de 12 ans et plus), 1000 sujets avec une urticaire chronique idiopathique (UCI) ont été inclus dans des études contrôlées versus placebo. La prise en charge des UCI démontrée par la réduction associée des démangeaisons, des érythèmes et des urticaires était supérieure avec un comprimé de loratadine 10 mg qu'avec le placebo. Dans ces études, l'incidence des cas de somnolence avec la loratadine était similaire au placebo.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Population pédiatrique

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Environ 200 patients pédiatriques (âgés de 6 à 12 ans) atteints de rhinite allergique saisonnière ont reçu des doses de sirop de loratadine allant jusqu'à 10 mg une fois par jour au cours d'essais cliniques contrôlés. Dans une autre étude, 60 patients pédiatriques (âgés de 2 à 5 ans) ont reçu 5 mg de sirop de loratadine une fois par jour. Aucun événement indésirable inattendu n'a été observé.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

L'efficacité pédiatrique était similaire à l'efficacité observée chez les adultes.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Absorption

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La loratadine est rapidement et bien absorbée. L'ingestion concomitante de nourriture peut entraîner un léger retard à l'absorption de la loratadine sans conséquence sur l'effet clinique. La biodisponibilité de la loratadine et de son métabolite actif est dose dépendante.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Distribution

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La liaison de la loratadine aux protéines circulantes est intense (97 % à 99 %), alors que celle du métabolite est plus modérée (73 % à 76 %).

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Chez les volontaires sains, les demi-vies de distribution de la loratadine et de son métabolite actif sont d'environ 1 et 2 heures respectivement.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Biotransformation

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Après administration par voie orale, la loratadine est rapidement et bien absorbée, et subit un important effet de premier passage hépatique, essentiellement par métabolisation par les CYP3A4 et CYP2D6. Le principal métabolite – la desloratadine – est pharmacologiquement actif et responsable en grande partie de l'effet clinique. Les concentrations plasmatiques maximales de loratadine et de desloratadine sont respectivement atteintes (T_{max}) entre 1-1,5 heures et 1,5-3,7 heures après l'administration.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Élimination

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Approximativement 40 % de la dose est excrétée dans les urines et 42 % dans les fèces sur une période de 10 jours et principalement sous forme de métabolites conjugués. Approximativement 27 % de la dose est éliminée dans les urines pendant les 24 premières heures. Moins de 1 % de la substance active est excrétée sous la forme active inchangée loratadine ou desloratadine.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

La demi-vie moyenne d'élimination chez les sujets volontaires sains était de 8,4 heures (fourchette de 3 à 20 heures) pour la loratadine et de 28 heures (fourchette de 8,8 à 92 heures) pour le principal métabolite actif.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Patients atteints d'insuffisance rénale

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, tant les valeurs d'AUC que les pics plasmatiques (C_{max}) de la loratadine et de son métabolite actif sont augmentés par rapport aux valeurs d'AUC et aux pics plasmatiques (C_{max}) observés chez les patients à fonction rénale normale. Les demi-vies d'élimination moyennes de la loratadine et de son métabolite actif ne sont pas significativement différentes de celles observées chez des sujets sains. L'hémodialyse n'a pas d'influence sur la pharmacocinétique de la loratadine ou de son métabolite actif chez les patients insuffisance rénale chronique.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Patients atteints de troubles hépatiques

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Chez les patients atteints de troubles hépatiques alcooliques chroniques, les valeurs d'AUC et les pics plasmatiques (C_{max}) étaient doublés, tandis que le profil pharmacocinétique du métabolite actif n'était pas significativement différent du profil présenté par les patients à fonction hépatique normale. Les demi-vies d'élimination moyennes de la loratadine et de son métabolite actif étaient respectivement de 24 et 37 heures, et augmentaient avec la sévérité de l'affection.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Sujets âgés

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Le profil pharmacocinétique de la loratadine et de son métabolite actif est comparable chez les volontaires sains adultes et âgés.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

5.3 Données de sécurité préclinique

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Les données non-cliniques ne révèlent pas de risque particulier pour l'homme sur base des études conventionnelles relatives à la sécurité pharmacologique, à la toxicité à doses répétées, à la génotoxicité et au potentiel carcinogène.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

On n'a pas observé d'effets tératogènes dans les études de toxicité de la reproduction, mais on a observé chez des rates une mise-bas plus longue et une réduction de la viabilité des jeunes pour des taux plasmatiques (AUC) 10 fois supérieurs à ceux obtenus avec les doses cliniques.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

6. DONNEES PHARMACEUTIQUES

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

6.1 Liste des excipients

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Lactose monohydraté

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Amidon de maïs

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Amidon pré-gélatinisé

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Stéarate de magnésium.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

6.2 Incompatibilités

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Sans objet.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

6.3 Durée de conservation

3 ans

6.4 Précautions particulières de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur

Les comprimés sont conditionnés en plaquettes transparentes en PVC/PVdC/aluminium ou en plaquettes blanches opaques en PVC/PVdC/aluminium avec 5, 7, 10, 15, 20, 28, 30, 50, 100 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

6.6 Précautions particulières d'élimination

Pas d'exigences particulières.

7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

Teva Pharma Belgium S.A.
Laarstraat 16,
B-2610 Wilrijk

8. NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

BE253434

9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

Date de première autorisation : Juin 2003

Date de dernier renouvellement : Septembre 2010

10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE

Date de dernière mise à jour du RCP :